

Priprema za rektoskopiju uz - podvezivanje hemoroida

Doći u zakazano vrijeme na pretragu .

DAN PRIJE PRETRAGE – prehrana tekuća (juhe, kompoti, kava, čaj sa šećerom, sokovi).
Popiti 1litru mlakog Donata Mg u toku dana

2) NA DAN PRETRAGE

Pretragu možete raditi u anesteziji ili bez anestezije ali zbog ugodnosti pacijenta prilikom pretrage preporučamo zahvat izvesti u kratkotrajnoj anesteziji. **Ne** piti **2** sata prije anestezije, **ne** jesti **6** sati prije anestezije.

Ako pretragu radite u anesteziji (obvezna pratnja,automobil ne smijete voziti sami).

3 sata prije zakazanog termina stavite 1 Dulcolax čepic u analni otvor . Nakon toga doći će do pražnjena crijeva .

Zatim 2 sata prije dolaska stavite još jedan Dulcolax čepić u analni otvor zbog dodatnog pražnjenja crijeva.

Nakon toga će se napraviti kratki pregled rektoskopija područja koje se treba podvezati te će Vam se postaviti ligature na mjesto koje odredi liječnik endoskopičar .

Predviđeno vrijeme ostanka u Poliklinici je 2 sata.

Preporuke nakon završenog zahvata

Ne piti ne jesti 2 sata nakon anestezije . Nakon toga možete uzeti normalnu prehranu .Piti koliko želite .

Ako imate bilo kakvih simptoma kao pojavu krvi u stolici **HITNO** se javite liječniku .