

UPUTE ZA KOLONOSKOPIJU

ČIŠĆENJE (podjeljena doza) Split doza - za pretrage koje se rade od 9 sati nadalje

- 1) **DAN PRIJE PRETRAGE** - prehrana tekuća (juhe, kompoti, kava, čaj sa šećerom, sokovi). Popiti 1litru mlakog Donata Mg u toku dana .
- 2) Moviprep jednu kutiju kupite u ljekarni(potreban za čišćenje crijeva) te . Espumisan capsule 40.mg 3 tablete .
- 3) MOVIPREP prvu dozu (vrećica A+B) rastopiti u 1 litri vode. Pripremljenu otopinu počnite piti od 18 sati do 19 sati te ju pijte u vremenskom periodu svakih **15 minuta po 2.5 dcl.**
- 4) Ako u tijeku uzimanja osjećate mučninu slobodno uzmite bombon u usta (mentol) kako bi se okus limuna i slatkoće smanjio. Za to vrijeme hodajte po kući.
- 5) Nakon tog možete uzimati tekućine koliko želite.

2) NA DAN PRETRAGE

- 1) MOVIPREP druga doza (vrećica A+B) priprema ista kao i dan ranije .
- 2) Način pijenja **svakih 15 minuta po 2,5 dcl otopine ostaje isti. Počnite piti od 5.30. do 6.30 h**
- 3) Nakon 30 minuta u (6 ,30) uzmite 3 Espumisan caps od 40 mg koje će te popiti s malo vode.
- 4) Prvo pražnjenje stolice događa se već u tijeku pijenja ili 30 minuta poslije.
- 5) Zadnji unos tekućine (voda, čaj) tolerira se do 2h prije zakazanog termina sa ili bez anestezije .
- 6) Ako pretragu radite u anesteziji (obvezna pratnja,automobil ne smijete voziti sami .